

WEINBAUSPRITZPLAN 2023

Mit aktiver Oidium- und Peronospora-Anti-Resistenz-Strategie gemäß FRAC-Richtlinien



Rebstadium	Zeitpunkt	Spritzdatum	Produkt	AWM/ha	Besondere Hinweise
	BBCH 13		WEINTEC (VERWIRRUNG)	max. 400 Dispenser/ha	Gegen Einbindigen und bekreuzten Traubenwickler
	Austriebs-spritzung		NETZSCHWEFEL KWIZDA	7,5 kg	Gegen Schadmilben und Phomopsis.
	Stadium 13 – 15 3 bis 5-Blattstadium		DELAN WG + FOSHIELD + KARMA SG + NETZSCHWEFEL KWIZDA	0,4 kg + 2 l + 0,8 % + 2 kg	Gegen Phomopsis, Peronospora, Roter Brenner. Systemisch gegen Peronospora. Max. 2 kg/ha. Gegen Oidium bei starkem Vorjahresbefall. Gegen Schadmilben und Phomopsis.
	Stadium 53 – 55 Triebe ca. 40 cm lang		REBOOT + FOSHIELD + SPIROX DUO* + NETZSCHWEFEL KWIZDA	0,2 kg + 3 l + 0,3 l/10.000 m ² + 3 kg	Mit Reboot und Foshield doppelt systemisch gegen Peronospora. Gegen Oidium, Schwarzfäule und Roter Brenner. Gegen Schadmilben und Oidium. + 2 l/ha AzoSpeed : N-betont, MG und S in Trockenphasen.
	Stadium 57 – 60 Kurz vor der Blüte		ZORVEC VINABEL* + FOSHIELD + TALENDO EXTRA + NETZSCHWEFEL KWIZDA ODER ZORVEC VINABEL* + NISSOVIN (=ZORVINO PACK) + NETZSCHWEFEL KWIZDA	0,38 l/10.000m ² + 3 l + 0,2 l + 2 kg 0,38 l/10.000 m ² + 0,25 l + 2 kg	Peronospora, Nebenwirkung Botrytis. Oidium, Nebenwirkung Schwarzfäule. Gegen Spring- und Heuwurm: 80 ml Spintor /ha oder 0,2 - 0,4 l Mimic /ha
Rebblüte					
	Stadium 60 - 65		FLORGIB TABLETTEN	max. 16 Tabl./10.000 m ²	Zur Lockerung des Stielgerüsts und als Botrytisvorbeuge
	Stadium 71 Abgehende Blüte - 1. Nachblüte		VIDERYO F + KUSABI (=KWIZDA WEIN PACK) + KARATHANE GOLD + FOSHIELD + NETZSCHWEFEL KWIZDA	2,5 l + 0,3 l + 0,3 l + 3 l + 2 kg	Mit Botrytis Nebenwirkung. Blattdünger: + 3 l/ha Wuxal Mg gegen Mg-Mangel und Stielähme; + 3 l/ha Wuxal K40 gegen Traubenwelke. + 2 kg/ha Prestop (+ 0,15 l/ha Designer) bei feuchter Witterung als Botrytisvorbeuge.
	Stadium 74 – 75 Schrotkorn- bis Erbsengröße		ZORVEC VINABEL* + FOSHIELD + SPIROX DUO* + NETZSCHWEFEL KWIZDA ODER ZORVEC VINABEL* + NISSOVIN (=ZORVINO PACK) + NETZSCHWEFEL KWIZDA	0,38 l/10.000 m ² + 3 l + 0,3 l/10.000 m ² + 3 kg 0,38 l/10.000 m ² + 0,5 l + 3 kg	Peronospora, Nebenwirkung Botrytis. Gegen Oidium, Schwarzfäule, Roter Brenner. Oidium, Roter Brenner, Schwarzfäule. Blattdünger: + 3 l/ha Wuxal Mg gegen Mg-Mangel und Stielähme; + 3 l/ha Wuxal K40 gegen Traubenwelke.
	Stadium 77 Beginn - Traubenschließen		VIDERYO F + KUSABI (=KWIZDA WEIN PACK) + KARATHANE GOLD + FOSHIELD + PRESTOP	2,5 l + 0,3 l + 0,3 l + 3 l + 2 kg	Peronospora, Oidium, Nebenwirkung Botrytis. Gegen Sauerwurm: 0,8 l/ha Mimic . Gegen Sauerwurm und Ohrwurm: 120 – 160 ml Spintor /ha. Blattdünger: + 3 l/ha Wuxal Mg gegen Mg-Mangel und Stielähme; + 3 l/ha Wuxal K40 gegen Traubenwelke.
	Stadium 79 Ende Traubenschluss		REBOOT + TALENDO EXTRA + CUPROFOR FLOW	0,4 kg + 0,4 l + 1 l	Peronospora, Nebenwirkung Botrytis. Oidium, Schwarzfäule wird mit erfasst. Für Abhärtung der Beerenhaut und Reintönigkeit der Weine; Botrytisvorbeuge.
	Stadium 81 Reifebeginn		VIDERYO F + KUSABI (=KWIZDA WEIN PACK)	2,5 l + 0,3 l	Doppelte Botrytis Nebenwirkung. 160 ml/ha Spintor gegen Kirschesigfliege laut Insect-Watch. Blattdünger: + 3 l/ha Wuxal Mg gegen Mg-Mangel und Stielähme; + 3 l/ha Wuxal K40 gegen Traubenwelke.
	Stadium 85 Weichwerden der Beeren		KUPFER FUSILAN WG oder REBOOT + KARMA SG	2,5 kg 0,4 kg + 0,8 %	Kupfer Fusilan WG verbessert die Holzreife und die Reintönigkeit der Weine. TZ: 0,5 %; 2 kg in max. 250 l Wasser
	Stadium 89 Vollreife der Beeren		KARMA SG + REBOOT	0,8 % + 0,4 kg	TZ: 0,5 %; 2 kg/ha in max. 250 l Wasser. Bei anhaltend starkem Peronosporadruck zur Verringerung von Blattbefall und des Sporen-Ausgangsmaterials im Folgejahr.

Pfl.Reg.Nr.: Netzschwefel Kwizda: 1941, Kupfer Fusilan WG: 3621, Talendo Extra: 3342, Karathane Gold 2981, Kusabi: 3825, NissoVin: 3157-901, Prestop: 3680, Cuprofor flow: 3034-901, Reboot: 3640, Zorvec Vinabel: 4369, Videryo F: 3783, Karma SG 3398, Spirox Duo: 3863-901, Delan WG: 3450, Florgib Tabletten: 3789, Spintor 3296, Mimic 2620.

* Zorvec Vinabel und Spirox Duo* - Berechnung siehe Seite 5

Zur Beachtung: Aufwand/ha je nach Reihenabstand, Laubwandhöhe und Infektionsdruck. Spritzabstände (10 – 12 Tage), beidseitige gründliche Benetzung, Spritzdruck (max. 18 bar), Temperatur (nicht bei Hitze über 25 °C) und die Fahrgeschwindigkeit (5 – 6 km/h) beachten. 0,15 l **Designer**/ha bei Traubenwaschungen zusetzen.

Beispiel letzte Vorblüte: 2,8m Reihenabstand; 80cm Laubwandhöhe = 5700m² = 0,2 lt/ha Zorvec Vinabel

Reihenfolge der Mischpartner: Zuerst Folienbeutel (Rührwerk erst nach Auflösen des Folienbeutels einschalten), dann WG- (wasserdispersg. Granulat), SC- (Suspensionskonzentrat) und zum Schluss EC-Produkte (Emulsionskonzentrat) bzw. flüssige Blattdünger in den Spritztank geben.

Kwizda

Agro