

PFLEGEPLAN BIO-KARTOFFEL



| Kartoffelkäfer | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | 1. Behandlung SPINTOR 50 ml/ha oder RAPTOL HP 0,6 l/ha | | | |
| | | 2. Behandlung SPINTOR 50 ml/ha oder NeemAzal 2,5 l/ha | | | |
| Kontrolle wöchentlich; Bekämpfungsschwelle: 1 Eigelege oder 5 Larven pro Pflanze | | | | | |



| Phytophthora | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | CUPROFOR FLOW 1,2 l/ha + PANAGRO 1,5 kg/ha + NU-FILM-P 0,3 l/ha | | | |
| | | CUPROFOR FLOW 0,8 l/ha + NU-FILM-P 0,3 l/ha | | | |
| 1. Behandlung mit erhöhter Aufwandmenge als Basisschutz. Anwendungszeitpunkt: Warndienst, Krankheitsdruck, Witterung Weitere Behandlungen alle 7 - 10 Tage bzw. nach starken Niederschlägen | | | | | |

Variante ohne Kupfer:
5 Behandlungen mit 1,5 kg/ha
Kwizda PanAgro im Abstand
von 14 Tagen

TRIFENDER WP 1 kg/ha (vor/bei Anbau)

Rhizoctonia, bakterielle Nassfäule (bei Aussaat mitausbringen)



| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| Wachstumsstadien BBCH | | | | | | | | | |
| 01 - 09 Keimung | 10 - 19 Blattentwicklung | 20 - 29 Blatt- und Stängel- ausbildung | 30 - 39 Längenwach- tum/Wuchshöhe | 40 - 49 Schließen des Bestandes | 50 - 59 Knospenbildung | 60 - 69 Blüte | 70 - 79 Ausbildung der Beeren | 80 - 89 Vergilben der Pflanze | 90 - 99 Reife der Knollen |

PIRETRO VERDE: Artikel 53 Zulassung gegen Spinnmilben beantragt (Nebenwirkung gegen Blattläuse, Zikaden und Kartoffelkäfer)

Pfl. Reg. Nr.: Cuprofor flow: 3034-901, Spintor: 3296/0, NeemAzal: 2699